



Terapia desensibilizzante per pazienti da sottoporre ad esami contrastografici

La terapia desensibilizzante deve essere attuata solo nei pazienti che presentano i seguenti rilievi anamnestici :

SOGGETTI A RISCHIO

- Pregressa reazione allergica o pseudo-allergica a seguito di un'indagine con la medesima classe di MdC da impiegare (per es. a base di gadolinio o di iodio)**
- Presenza di asma bronchiale o orticaria–angioedema non controllati dalla terapia farmacologica**
- Mastocitosi**
- Pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i di anafilassi in cui non è riconoscibile la causa scatenante)**

Premedicazione in caso di pregressa reazione allergica o pseudo-allergica a MdC

FARMACI	13 ore prima dell'esame	7 ore prima dell'esame	1 ora prima dell'esame
PREDNISONE 25 mg o METILPREDNISOLONE 16 mg + CETIRZINA 10 mg	2 cp OS	2 cp OS	2 cp OS 1 cp OS
<i>oppure</i>			
METILPREDNISOLONE 40 mg + CLORFENAMINA 10 mg	1 fl EV	1 fl EV	1 fl EV 1 fl EV



**Modulo Terapia Desensibilizzante-Profilassi Reazioni Anafilattoidi
alla somministrazione di MDC**

Rev. 02
Agosto 2019

Pagina
2 di 2

Premedicazione in caso di angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica

FARMACI	12 ore prima dell'esame	2 ore prima dell'esame	1 ora prima dell'esame
PREDNISONE 25 mg o METILPREDNISOLONE 16 mg + CERITIZINA 10 mg	2 cp OS	2 cp OS	1 cp OS
<i>oppure</i>			
METILPREDNISOLONE 40 mg + CLORFENAMINA 10 mg + MONTELUKAST 10 mg	1 fl EV	1 fl EV	1 fl EV 1 cp OS

Premedicazione in caso di esame in urgenza, orticaria in atto o asma bronchiale sintomatico

FARMACI	Subito prima dell'esame
IDROCORTISONE 200 mg + CLORFENAMINA 10 mg	1 fl EV 1 fl EV